




SODBRENNEN INTELLIGENT MANAGEN.

Talcid[®] *regelt das.*

Intelligent ist, mit der Magensäure zu arbeiten und nicht gegen sie.

Talcid® neutralisiert die Magensäure kontrolliert und schnell:

- ✓ Das Schichtgitter Hydrotalcit setzt **individuell** nur so viele neutralisierende Ionen frei wie nötig, bis ein **optimaler pH-Wert von 4,5** erreicht wird. Der restliche Wirkstoff **reagiert** bei wiederholter Übersäuerung erneut.
- ✓ **99%ige Neutralisation** der überschüssigen Säure in Sekunden¹



● Mg^{2+} ● Al^{3+} ● OH^{-} ● CO_3^{2-} und H_2O



pH-Wert 4,5



Zu sauer

Reizung der Magenschleimhaut möglich

Talcid®

Kontrollierte Neutralisation in den optimalen pH-Bereich


Neutral/alkalisch

Beeinträchtigung der physiologischen Funktion der Magensäure

Intelligent ist, den natürlichen Schutz der Magenschleimhaut zu aktivieren.

Talcid® besitzt zell- und schleimhautschützende Eigenschaften:

- ✓ COX-2 wird aktiviert – dadurch wird die Synthese des **Magenschutzhormons PGE₂** gesteigert.
- ✓ **PGE₂ wirkt** lokal im Magen **mukosaprotektiv**, denn es steigert die mukosale Durchblutung, Zellregeneration, Bicarbonat- und Schleimsekretion.²




● PGE₂ ≡ Schleimschicht ≡ Magenschleimhaut

¹ In-vitro-Untersuchung: Miederer SE et al. Chin J Dig Dis. 2003;4:140-146.

² In-vitro-Untersuchungen: Tarnawski A et al. Curr Pharm Des. 2013;19:126-132.

Talcid® arbeitet mit der Magensäure und der Magenschleimhaut.²



- + Magensäure wird **kontrolliert und schnell neutralisiert**

- + **Keine Reizung der Magen- und Speiseröhrenschleimhaut** durch überschüssige Säure

- + **Aktiver Magenschutz** durch Aktivierung körpereigener Schutzmechanismen²

Jetzt Wirkdemo ansehen auf
www.talcid.de/fachkreise



Talcid® mit dem
intelligenten
Wirkprinzip.
Erhältlich in zwei
Darreichungsformen.



Talcid®
Kautabletten

- ✓ 500 mg Hydrotalcit
- ⊕ Leicht zu kauen
- ⊕ Lösen sich schnell im Mund auf und krümeln nicht

Talcid®
Liquid

- ✓ 1000 mg Hydrotalcit
- ⊕ Ideal auch zur nächtlichen Einnahme
- ⊕ Kleidet die gereizte Speiseröhre optimal aus

Talcid® Kautabletten, Talcid® Liquid. Wirkstoff: Hydrotalcit. **Zusammensetzung:** 1 Kautablette Talcid enthält: 500 mg Hydrotalcit. Sonstige Bestandteile: Mannitol, Maisstärke, Magnesiumstearat, Saccharin-Natrium, Pfefferminz-Aroma (enthält Menthol), Bananen-Aroma. 10 ml Talcid Liquid (1 Beutel Suspension) enthalten: 1000 mg Hydrotalcit. Sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Carmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid, Bentonit, Zimtöl, Saccharin-Natrium, Aromastoff. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomatischen Behandlung von Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre (Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni); Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden. **Gegenanzeigen:** Allergie gegen Hydrotalcit (nur Kautabletten: zusätzlich Menthol) oder einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Nierenfunktionsstörungen, Myasthenia gravis und Hypophosphatämie. Bei eingeschränkter Nierenfunktion nur unter ärztlicher Kontrolle des Serumspiegels von Magnesium und Aluminium. **Nebenwirkungen:** Immunsystem: Allergische Reaktionen möglich. Magen-Darm-Trakt: Bei hoher Dosierung kann es zu Verstopfung, breiigem Stuhl, erhöhter Stuhlfrequenz bis hin zu Durchfall und Erbrechen kommen. Nieren und Harnwege: Bei stark eingeschränkter Nierenfunktion kann Talcid Hypermagnesiämie und Anstieg der Serum-Aluminiumspiegel verursachen; bei Niereninsuffizienz und bei langfristiger Einnahme hoher Dosen kann es zur Aluminiumeinlagerung vor allem in das Nerven- und Knochengewebe und zur Phosphatverarmung kommen. Häufigkeiten: nicht bekannt. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Siehe Fachinformation. **Hinweis:** nur Kautabletten: Enthält Menthol (Pfefferminz-Aroma). **Stand der Information:** 12/2022. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland.



Art-Nr: 89003199

Talcid® regelt das.